

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷五十四

詳校官太醫院八品吏目臣黃發

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣汪 鏞

騰錄監生臣王永年

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷五十四

編輯幼科雜病心法要訣目錄

痰證門

痰證總括

燥痰

清氣化痰丸

蘇葶滾痰丸

濕痰

枳桔二陳湯

桂苓甘朮湯

疝證門

疝證總括

寒疝

烏頭桂枝湯

金菜丸

濕熱感寒疝

烏頭梔子湯

胎疝

十味蒼蘘散

金鈴散

川楝丸

陰腫

疎風五苓散

加味五苓散

導赤散

加味守效丸

小腸氣

加味香蘇散

加味失笑散

胡盧巴丸

淋證門

淋證總括

寒淋

五苓散

熱淋

十味導赤湯

八正散

石淋

葵子散

八正散

血淋

小蘗飲子

五淋散

頭痛門

頭痛總括

風寒頭痛

清穴膏

內熱頭痛

加味茶調散

腹痛門

腹痛總括

食痛

小承氣湯

香砂平胃散

寒痛

理中湯

蟲痛

錢氏安蟲散

加減理中湯

內食外寒腹痛

藿香和中湯

黃疸門

黃疸總括

陽黃

茵陳麻黃湯

茵陳蒿湯

茵陳五苓散

陰黃

茵陳理中湯

茵陳四逆湯

水腫門

水腫總括

風水腫

越婢湯

濕水腫

貼臍法

沉香琥珀丸

風濕腫

疏鑿飲

茯苓導水湯

蘇葶丸

舟車神祐丸

陽水

大聖瀆川散

舟車神祐丸

陰水

實脾散

金匱腎氣丸

腹脹門

腹脹總括

虛脹

香朴四君子湯

實脹

加味平胃散

小承氣湯

御纂醫宗金鑑卷五十四目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷五十四

編輯幼科雜病心法要訣

痰證門

痰證總括

痰因津液不四布陰盛為飲陽盛痰稠黏黃色為燥熱
清稀色白乃濕寒

註痰者水穀所化之津液不能四布留於胸中而成

者也多因飲食無節或乳食過食厚味脾胃不能
運化而生若陰氣素盛則化而為飲陽氣素盛則
化而為痰稠黏黃色澁滯難出謂之燥痰清稀色
白滑而易出謂之濕痰二者或宜清潤或宜通利
治各不同也

燥痰

燥痰肺燥澁難出氣逆喘臥不舒面紅口乾小便赤
清氣化痰滾痰亭

註
燥痰者痰因火動也火盛則痰多燥黏氣逆喘咳

夜卧不寧面赤口乾小便黃赤輕者用清氣化痰丸清之重者用蘇葶滾痰丸下之

清氣化痰丸

膽南星

九轉

半夏

各一兩五錢
薑製

橘紅

枳實

麩炒

杏仁

炒去皮尖

桔萸仁

去油

黃芩

酒炒

白茯苓

各一兩

右為細末薑汁為丸淡薑湯化服

蘇葶滾痰丸 方見食積欬嗽

濕痰

濕痰脾濕懶飲食倦怠嗜卧面色黃痰多枳桔二陳劑
飲多桂苓甘朮湯

註

濕痰者因小兒過食生冷油膩之物有傷脾胃遂
致脾土虛濕不能運化而成濕痰滑而易出脾虛
不運故懶食脾主四肢故倦怠嗜卧脾屬土故面

色多黃痰多者宜用枳桔二陳湯加蒼朮白朮除濕化痰飲盛者須用桂苓甘朮湯扶陽散飲調治合宜而痰自化矣

枳桔二陳湯

方見呪乳

桂苓甘朮湯

茯苓

桂枝

甘草

生

白朮

土炒

引用生薑水煎服

方歌
桂苓甘朮濕痰飲除濕利飲更扶陽茯苓桂枝生
甘草白朮土炒引生薑

疝證門

疝證總括

諸疝厥陰任脈病外因風寒邪聚疑內因濕熱為寒鬱
證皆牽掣引腹疼胎疝多因稟賦病總審熱縱寒痛疼
血左不移氣右動濕則墜重虛墜輕

註

厥陰環陰器入少腹任脈起於中極之下以上毛
際循腹裏上關元故諸病疝莫不屬之也小兒病
此多因先天不足本藏虛弱復因外感風邪內食

生冷寒邪凝結而成者有之或因濕熱鬱於中復
被寒邪束於外邪氣乘虛并於血隊流入厥陰厥
陰屬肝其性急速故牽引辜丸少腹絞痛也又有
胎疝一證多因孕婦啼泣過傷動於陰氣結聚不
散令兒生下即成此證者大抵熱則多縱寒則多
痛在血分者不移在氣分者多動濕腫墜則重虛
腫墜則輕因證施治自切中病情矣

寒疝

寒濕內蓄日已深復被風冷水氣侵囊冷硬痛成寒疝
烏頭桂枝金菜神

註

寒疝者因兒平日過食生冷或卧濕地以致陰結
於內氣滯不行為日既久復為風冷所束水濕所
傷故發時囊冷結硬牽引少腹作痛初得之兼表
者以烏頭桂枝湯主之寒甚者以金菜丸治之

烏頭桂枝湯

桂枝

赤芍藥

甘草

炙

烏頭

引用生薑水煎服

方歌烏頭桂枝治寒疝解表溫中法最良廣桂枝同赤

芍藥烏頭甘草引生薑

金菜丸

金鈴子肉

一兩

吳茱萸

五錢

右為細末酒煮麩糊為丸如麻子大每服數丸鹽

湯下

濕熱感寒疔

厚味過度生濕熱復觸風寒疔氣成囊縱紅腫常刺痛
烏頭梔子服即寧

註

小兒平素過食厚味致生濕熱濕熱之氣下行流入囊中復為風寒所束而疔證成矣發時囊縱紅腫常常刺痛當以烏頭梔子湯調治之庶疔可愈矣

烏頭梔子湯

烏頭

梔子

炒

引用順流水入薑汁煎服

方歌濕熱感寒疝氣疼烏頭梔子湯最靈梔子烏頭薑

汁共順流水煎病即寧

胎疝

胎疝多因母過啼兒生胞硬痛無時輕用十味蒼藥治
重用金鈴川棟宜

註

胎疝者因孕婦啼泣過傷氣結不散蘊於胞中令

兒生下胞硬疼痛輕者十味蒼蘘散主之
金鈴散或川棟丸主之

十味蒼蘘散

青皮

醋炒

川附子

炮

黃蘘

南山查肉

酒炒

蒼朮

米泔水浸

香附

製

益智仁

元胡索

醋炒

桃仁

甘草

炙

引用小茴香水煎服

方歌
十味蒼藥治胎疝青皮川附藥查蒼香附益智元

胡索桃仁甘草引茴香

金鈴散

三棱

莪朮 各三錢

陳皮

赤茯苓 各五錢

茴香 三錢

甘草 二錢
生

檳榔

枳殼 各三錢
麩炒

鈎藤鈎

青皮各四錢
炒

南木香三錢

金鈴子肉一兩

右除檳榔木香不過火餘焙共為細末每服半錢
至一錢無灰酒調服

川棟丸

木香

檳榔

三棱

莪朮各三錢

青皮

醋炒

陳皮各四錢

川棟肉 八錢

芫花 五分
醋炒

辣桂 二錢

牽牛 二錢
生取仁

巴豆 三粒
去油

右為極細末麩糊為丸如麻子大每服三四丸薑

湯送下

陰腫

陰囊腫大邪氣凝風癢濕墜熱多疼疏風五苓導赤散

偏墜守效丸最靈

註

陰器者乃諸筋之總會也因邪客於少陰厥陰之經濕熱之氣與風冷之氣相搏氣不得通故結聚而陰囊腫大總之風盛多癢濕盛多墜熱盛多疼如外腎膚囊腫大癢痛墜下此風濕襲於下也宜疏風五苓散主之如外腎膚囊腫痛光亮此因心火移熱於小腸故也宜加味五苓散或導赤散主之更有偏墜一證或左或右辜丸作腫者此因食積不消濕氣下行故也宜加味守效丸主之

疏風五苓散

防風

蒼朮

米泔水浸

肉桂

羌活

豬苓

澤瀉

赤茯苓

白朮

土炒

引用生薑水煎服

方歌陰腫疏風五苓散防風蒼朮肉桂羌豬苓澤瀉赤

苓朮煎服之時入生薑

加味五苓散

金鈴子

白朮

土炒

澤瀉

木通

茴香

炒

赤茯苓

橘核仁

肉桂

檳榔

豬苓

引用生薑燈心水煎服

方歌 五苓散內用金鈴白朮澤瀉與木通茴香赤苓橘

核配肉桂檳榔合豬苓

導赤散

方見不小便

加味守效丸

南星

山查肉

酒炒

蒼朮

各二兩
炒

白芷

半夏

薑製

橘核仁

神麩

各一兩
炒

海藻

昆布

各五錢

吳茱萸

青皮

醋炒

元胡索

醋炒

荔枝核

各一兩
炒

右共為末神麩糊為丸如梧桐子大每服三十九
空心酒下

小腸氣

痛引腰脊小腸氣加味香蘇溫散宜上衝心痛失笑散
有形胡盧巴丸醫

註

小腸氣一證其受病與疝氣等亦因濕氣在內而

寒氣又束於外也發時少腹脹控臑丸引腰脊上衝心痛而不腫是也治宜分別形狀如引腰而痛者加味香蘇散溫散之痛而衝心氣者加味失笑散主之如少腹中有形如卵上下往來痛不可忍者宜胡盧巴丸主之

加味香蘇散

蒼朮

米泔水浸

陳皮

川棟肉

甘草

蘇葉

香附

醋炒

引用連鬚葱白水酒兌煎服

方歌加味香蘇散蒼朮廣陳皮與川棟肉甘草蘇葉香

附同連鬚葱白共煎服

加味失笑散

五靈脂

蒲黃

隔紙炒

元胡索

各等分
醋炒

右為細末每服一二錢水酒調下

胡盧巴丸

胡盧巴

炒

川棟子

各四錢
蒸去皮核焙

川烏

去皮臍

巴戟肉

各一錢五分

茴香

三錢

吳茱萸

二錢五分
半酒半醋浸一宿焙

牽牛

二錢
炒

右共為細末酒麩糊為丸如梧桐子大每服數丸
空心溫酒下

淋證門

淋證總括

諸淋皆緣寒熱濕下移膀胱洩無時水道澀滯常作痛
寒熱石血隨證醫

註

小兒淋證或因風寒襲入或因濕熱下移乘入膀胱
以致水道澀滯欲出不出淋漓不斷甚至窒塞
其間令兒作痛然必辨其為寒為熱為石為血分
別治之則水道宣通淋自愈矣

寒淋

冷氣入胞成寒淋小便閉塞脹難禁淋漓不斷腹隱痛
五苓倍桂小茴神

註

寒淋者皆因風寒乘入膀胱致下焦受冷遂成寒
淋其候小便閉塞脹痛難禁不時淋漓少腹隱痛
須以五苓散倍加肉桂小茴香治之其淋自愈

五苓散

白朮

土炒

澤瀉

豬苓

肉桂

小茴香

赤茯苓

水煎服

方歌五苓治寒淋白朮澤豬苓肉桂加倍用茴香赤茯苓

苓

熱淋

膀胱蓄熱淋證成十味道導赤有奇功小腹脹滿大便結
急服八正莫少停

註熱淋者膀胱蓄熱而成也小便不通淋漓澀痛以十味導赤湯主之若少腹脹滿引臍作痛大便秘結者以八正散主之

十味導赤湯

生地

山梔子

木通

瞿麥

滑石

淡竹葉

茵陳蒿

黃芩

甘草
生

豬苓

水煎服

方歌十味道導赤藥最靈生地山梔合木通瞿麥滑石淡

竹葉茵陳黃芩草豬苓

八正散
方見不小便

石淋

濕熱蓄久石淋成溲如沙石莖中疼輕者須用葵子散
重則八正可相從

註

石淋者逢溺則莖中作痛常帶沙石之狀因膀胱蓄熱日久所致正如湯瓶久經火煉底結白礮也輕則葵子散主之重則八正散主之

葵子散

桑皮

炒

瞿麥

梔子

赤茯苓

木通

車前子

甘草

生

葵子

水煎服

方歌 葵子散治石淋證桑皮瞿麥山梔仁赤苓木通車

前子甘草葵子共和勻

八正散

方見不小便

血淋

血淋心熱傷血分尿血同出莖中疼清利須用小蘗飲
莖中痛甚五淋從

註

血淋者蓋因心熱傷於血分熱氣傳入於胞日久

則尿血同出遂成血淋莖中不時作痛須以小薊
飲子治之若莖中痛甚者五淋散主之

小薊飲子

通草

滑石

淡竹葉

當歸

小薊

梔子

炒

甘草

生

生地

蒲黃

藕節

水煎空心服

方歌
小蘗飲子治淋血通草滑石淡竹葉當歸小蘗山

梔甘生地蒲黃合藕節

五淋散

當歸

赤芍

苦苧蘆

黃芩炒

木通

梔子

車前子

淡竹葉

滑石

葵子

甘草

生

赤茯苓

引用葱白水煎服

方歌

五淋血淋莖中疼歸芍葶麩苓木通梔子車前淡

竹葉滑石葵子草赤苓

頭痛門

頭痛總括

小兒頭痛分表裏裏屬內熱表寒風風寒外閉須疎散
內熱薰蒸以清攻

註

小兒頭痛之證不一有在表在裏之分在表者外
感風寒也法宜疎散之在裏者內熱薰蒸也法宜
清解之苟能調治得宜則頭痛自除矣

風寒頭痛

風寒頭痛屬太陽上及巔頂額角傍惡寒無汗身發熱
加味清空自堪嚙

註

風寒頭痛者乃太陽經受邪也其候惡寒發熱上
及巔頂下連額角不時作痛法宜取汗悉以清空
膏主之如痛甚者於本方中加細辛熱盛便秘者
於本方中加川大黃

清空膏

羌活

防風

柴胡

川芎

黃芩

黃連

甘草

主

引用生薑水煎服

痛甚加細辛

便秘加川大黃

方歌 風熱上攻頭疼痛加味
清空膏最良羌防柴芎芩

連草痛甚加辛便秘黃

內熱頭痛

內熱頭痛屬陽明鼻乾目痛齒頰疼清熱加味茶調治
便秘加入大黃攻

註

胃熱頭痛病在陽明因小兒肥甘無節胃火上炎
故發時鼻乾目痛上至頭下至齒頰痛無定時宜
加味茶調散清之

加味茶調散

荊芥穗

薄荷

黃芩

青茶葉

石膏

生

白芷

川芎

引用生薑水煎服

便秘者加川大黃

方歌加味茶調治頭疼胃經積熱上攻冲荆穗薄荷芩

茶葉石膏生用芷川芎

腹痛門

腹痛總括

小兒腹痛有四因食寒蟲動痛相侵停食感寒相兼痛
臨證醫治要詳分

註

小兒腹痛其證有四如寒痛食痛蟲痛停食感寒
痛也須隨證施治寒則溫中食則消導蟲則安蟲
停食感寒則消散調治合宜其痛自除矣

食痛

食痛傷食心胃痛食入即痛喜飲涼惡食腹滿吐便秘
承氣平胃酌量嗜

註

食痛者皆因飲食不節積滯不化所致故食入即
痛也其候喜飲涼水惡食腹滿吐酸便秘宜先以
小承氣湯下之若下後仍痛者以香砂平胃散消
導可也

小承氣湯

大黃

枳實

麩炒

厚朴

薑炒

引用生薑水煎服

方歌 小承氣湯治腹痛腹硬煩渴便不通枳實厚朴大

黃共煎服便利立時鬆

香砂平胃散

蒼朮

米泔水浸炒

陳皮

厚樸

薑炒

甘草

炙

縮砂

研

香附

醋炒

南山查

神麩炒

麥芽

炒

枳殼

麩炒

白芍

炒

引用生薑水煎服

方歌

香砂平胃傷食痛下後仍痛用此和蒼陳朴草縮

香附山查麩麥枳殼芍

寒痛

寒痛中虛脾受寒尿爪俱白面青看喜熱腹滿或下利

理中肢厥加附煎

註

寒痛者多因小兒中氣虛弱復為風冷所乘則脾經受寒故不時腹痛現證尿白爪甲白面多青喜飲熱或腹滿下利宜理中湯溫之若四肢厥冷兼屬少陰則加附子

理中湯

方見不乳

蟲痛

蟲痛不安腹因痛面色乍青乍赤白時痛時止吐清涎

安蟲理中治最合

註

蟲痛者因腹中蟲動不安故腹中作痛其候面色
乍赤乍青乍白其痛時作時止時吐清水切不可
妄用攻下當以安蟲為主其痛即除新痛者錢氏
安蟲散治之痛久不愈者加減理中湯治之

錢氏安蟲散

胡粉

炒黃

鶴虱

炒黃

白礬

枯

川棟子

各二錢五分
去皮核

右為細末每服二匙大者五分米飲調下痛時服

加減理中湯

方見蟲吐

內食外寒腹痛

內傷乳食外感寒發熱惡寒腹痛兼惡食嘔吐多啼叫
藿香和中可急煎

註

小兒內傷乳食外感寒邪遂致食寒凝結腹中作
痛其候發熱惡寒而更兼腹痛惡食嘔吐啼叫不
已者以藿香和中湯治之

藿香和中湯

藿香

砂仁
研

羌活

蒼朮
米泔水浸

陳皮

厚朴
薑炒

甘草
生

山楂

香附
炙

白芷

蘇葉

川芎

引用生薑水煎服

方藿香和中治腹疼內傷食滯外寒風藿砂羌蒼陳
歌
朴草山查香附芷蘇芎

黃疸門

黃疸總括

黃疸濕熱鬱蒸成徧身皆黃及目睛陽黃色亮身多熱
陰黃色暗冷如冰

註

黃疸一證乃濕熱鬱久外發肌膚而然也其候徧
身面目皆黃甚則深黃面如烟薰之狀其中又有
陰陽之別如面紅口渴尿赤色亮身熱者乃脾家
濕熱此陽黃也口不渴而色暗黃身冷如冰者乃

脾腎寒濕此陰黃也治者宜分別施治

陽黃

陽黃無汗宜踈散茵陳麻黃能發汗腹滿便秘茵陳攻
表裏無證茵苓善

註

陽黃一證原因濕熱而成治者當詳審之如表實
無汗宜外發其汗茵陳麻黃湯主之使黃從表解
也裏實二便秘瀆腹滿者宜茵陳蒿湯下之使黃
從裏解也若表有汗裏不便秘腹滿是表裏無證

不可汗下惟利小便宜用茵陳五苓散使黃從水道利之則愈

茵陳麻黃湯

茵陳蒿

麻黃

水煎加黃酒少許服之

方歌兒發陽黃身無汗茵陳麻黃湯極便麻黃茵陳各

等分量兒煎服有奇驗

茵陳蒿湯

茵陳蒿

川大黃

梔子

引用燈心水煎服

方歌

裏實須用茵陳湯
梔子茵陳生大黃
燈心為引水
煎服便利黃消體
泰康

茵陳五苓散

茵陳蒿

赤苓

豬苓

澤瀉

白朮

土炒

肉桂

引用燈心水煎服

方歌茵陳五苓治黃病利水除濕有奇功
朮苓澤瀉豬

苓桂茵陳加入便自清

陰黃

陰黃多緣轉屬成脾濕腎寒兩虧生溫脾茵陳理中治
溫腎茵陳四逆靈

註

陰黃者乃脾濕腎寒兩虛而成此最為危候溫脾

去黃以理中湯加茵陳主之溫腎去黃以茵陳四逆湯主之

茵陳理中湯

方見不乳

茵陳四逆湯

附子

製

乾薑

茵陳蒿

甘草

炙

水煎服

方歌 茵陳四逆湯附子共乾薑茵陳炙甘草黃消病漸

康

水腫門

水腫總括

水腫俱屬脾肺經肺喘脾脹要分明上腫屬風宜汗散
下腫屬濕利水靈通身腫者兼汗利喘則逐飲脹則攻
再辨陽水與陰水攻瀉溫補貴變通

註

小兒水腫皆因水停於脾肺二經水停胸中則喘
水停膈下則脹其間所腫部位不可不察如腫在
腰以上者屬風法宜發汗腫在腰以下者屬濕法

宜利水有通身上下皆腫者係風濕兩傷法宜汗利兼施腫而喘不得卧宜逐肺飲腫而脹滿便秘宜攻脾水腫從腹起至四肢者可治腫從四肢起至腹者不可治然又有陽水陰水之分宜詳別焉陽水屬實法宜攻泄陰水屬虛法宜溫補應證而施自無不效也

風水腫

腫在上者因風起急宜發汗莫從容越婢湯中加蒼朮

汗後全消病卽寧

註

上身腫者頭面肩臂至腰間皆腫也病因外感風邪法宜發汗則愈經所謂開鬼門是也以越婢加蒼朮湯治之

越婢湯

麻黃

石膏

煨

甘草

生

蒼朮

米泔水浸

水煎服

方歌越婢湯治風水腫麻黃甘草共石膏再加蒼朮水

煎服能使兒童腫即消

濕水腫

腫在下者因濕起急宜利水可安然外法貼臍如神妙
內服沉香琥珀丸

註

下身腫者腰臍至兩足皆腫也病因脾經濕熱所
成急用利水之法經所謂潔淨府是也外用貼臍
法內服沉香琥珀丸

貼臍法

巴豆

四錢
去油

水礬粉
二錢

硫黃

一錢

右研勻成餅先用新棉一片包藥布臍上外用帛
縛時許自然瀉下惡水待下三五次去藥以粥補
住

沉香琥珀丸

苦苧蘆子

一兩五錢

郁李仁

一兩五錢
去皮

防己 七錢五分

沉香 一兩五錢

陳皮

七錢五分
去白

琥珀

五錢

杏仁

五錢
去皮尖炒

蘇子

五錢

赤苓

五錢

澤瀉

五錢

共為細末煉蜜為丸如梧桐子大以麝香為衣每服一錢量兒大小與之用滾白水下

風濕腫

通身皆腫屬風濕外散內利最相宜峻攻則用疏鑿飲

和劑茯苓導水醫水上攻肺喘不卧蘇葶定喘最相宜
水停中州脹急滿舟車神祐量攻之

註

通身腫者頭面手足皆腫也得病之由內停濕飲
外感風邪風濕相搏水道不利外攻肌表因而作
腫也重者用疏鑿飲峻攻之輕者用茯苓導水湯
和解之若水停上攻於肺喘急不得卧者以蘇葶
丸瀉之水停中州脹滿者以舟車神祐丸攻之

疏鑿飲

商陸

秦艽

羌活

椒目

木通

赤小豆

茯苓皮

大腹皮

澤瀉

檳榔

引用薑皮水煎服

方歌疏鑿飲子風濕腫外發內利陸秦羌椒目木通赤

小豆苓皮大腹澤檳榔

茯苓導水湯

紫蘇

陳皮

白朮

土炒

木香

桑白皮

炒

麥冬

去心

赤茯苓

澤瀉

木瓜

大腹皮

縮砂仁

檳榔

引用燈心水煎服

方歌和解茯苓導水湯紫蘇陳皮木木香桑皮麥冬赤

苓澤木瓜大腹縮櫛榔

蘇葶丸方見痰飲喘急

舟車神祐丸

甘遂

芫花

大戟

各一兩
俱醋炒

大黃

二兩

黑牽牛

四兩
頭末

青皮

炒

陳皮

木香

檳榔 各五錢

輕粉 一錢

右為細末水丸如椒目大小兒二丸三丸大兒五丸七丸量服之滾白水送下

陽水

陽水身熱面沉數小便赤濇大便難熱盛煩渴濬川散濕盛脹滿神祐丸量兒大小斟酌用應變而施勿一偏

註

陽水者小兒濕熱內鬱水道阻塞外攻肌表以致外腫內脹發熱口渴心煩小便短赤大便秘結法

當泄水不可少緩熱盛煩渴者以大聖瀆川散攻之濕盛脹滿者舟車神祐丸攻之須量兒大小視病輕重合宜而用勿執一偏過於峻攻徒傷正氣也

大聖瀆川散

川大黃

煨

牽牛

取頭末

郁李仁

各一兩

木香

三錢

芒消

三錢

甘遂

五分

右為細末薑湯調下量兒大小用之

舟車神祐丸

方見風濕腫

陰水

陰水便利不煩熱須服實脾腎氣丸若服溫補俱無驗
攻補兼施病始痊

註

陰水者因脾腎虛弱也脾虛不能制水腎虛不能
主水以致外泛作腫內停作脹若二便不實身不
熱心不煩者宜用實脾散金匱腎氣丸若服溫補

之藥而無效驗者則是虛中有實也欲投攻下之劑恐小兒難堪若不攻之又豈可坐以待斃須攻補兼施或一補一攻或三補一攻或九補一攻審其進退俟有可攻之機以意消息藥與元氣相當始能逐邪而不傷正也必須忌鹽醬百日方可收功

實脾散

草果仁

研

大腹皮

木瓜

木香
研

厚朴

薑炒

乾薑

附子

製

白朮

土炒

茯苓

甘草
炙

引用棗二枚水煎服

方歌實脾散治陰水腫草果大腹木瓜香厚朴薑附朮

苓草虛者仍兼腎氣方

金匱腎氣丸

熟地黄 一两

山藥 八錢
炒

山茱萸 八錢

牡丹皮 五錢

茯苓 一两

澤瀉 五錢

肉桂 五錢

淡附子 五錢

車前子 五錢

牛膝 八錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服錢半白滾水送下

腹脹門

腹脹總括

腹脹脾虛因久病胃實多由食滯停補虛健脾兼理氣
攻食消導自然寧

註

腹脹之病脾胃二經主之有虛有實宜分晰焉虛
者因久病內傷其脾實者因飲食停滯於胃虛則
補脾實則消導調治合宜其脹自漸除矣

虛脹

久病脾虛失運健或因吐瀉暴傷脾食少卽脹精神倦
面黃肌瘦四君宜

註

凡小兒久病脾虛或吐瀉暴傷脾氣健運失常所
以飲食不化食少腹卽脹滿現證精神倦怠面黃
肌瘦此虛脹也宜用香朴四君子湯治之

香朴四君子湯

人參

白朮

土炒

白茯苓

甘草

炙

香附

製

厚樸

薑炒

引用生薑水煎服

方歌

香朴四君治虛脹參朮甘草共茯苓香附厚朴宜
加入引薑煎服脹卽寧

實脹

飲食過度內傷胃停滯腹脹便不通潮熱煩渴形氣壯
平胃承氣施治靈

註

小兒飲食過度則胃中停滯以致腹脹大便不利

身體潮熱心煩口渴形氣壯實此實脹也輕者平
胃散主之重者小承氣湯主之

加味平胃散

南蒼朮

炒

厚樸

薑炒

大腹皮

製

甘草

生

陳皮

萊菔子

焙

山查

麥芽

炒

神麴


炒

引用生薑水煎服

方歌 加味平胃治實脹蒼朮厚朴大腹皮甘草陳皮萊

腹子山查麥芽炒神麴

小承氣湯 方見食痛



御纂醫宗金鑑卷五十四

欽定四庫全書

子部
御纂醫宗金鑑卷五十五

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勛

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣汪 鏞

謄錄監生臣顧永涵

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷五十五

編輯幼科雜病心法要訣目錄

發熱門

諸熱總括

表熱

十神湯

雙解通聖湯

裏熱

調胃承氣湯

白虎湯

黃連解毒湯

虛熱

補中益氣湯

竹葉石膏湯

白通湯

實熱

涼膈散

大柴胡湯

積滯門

積滯總括

乳滯

消乳丸

食滯

木香大安丸

小承氣湯

癖疾門

癖疾總括

癖疾

千金消癖丸

木香丸

紅花膏

汗證門

汗證總括

自汗

玉屏風散

桂枝加附子湯

白虎湯

調胃承氣湯

盜汗

酸棗仁湯

當歸六黃湯

失血門

失血總括

衄血

麻黃湯

桂枝湯

犀角地黄湯

四物三黃瀉心湯

髮灰散

吐血

犀角地黃湯

桃仁承氣湯

加味四物湯

鷄蘇散

加味救肺散

便血

皂刺大黃湯

槐花散

平胃地榆湯

升陽和血湯

人參養榮湯

溺血

牛膝四物湯

雜證門

二便秘結

八正散

神芎丸

氣虛脫肛

補中益氣湯

真人養藏湯

瀉腸散

肛腫翻肛

皂刺大黃湯

曾氏蟠龍散

龜胸

寬氣飲

百合丹

龜背

松蘿丹

五軟

補腎地黃丸

扶元散

五鞭

小續命湯

烏藥順氣散

加味六君子湯

五遲

加味六味地黃丸

補中益氣湯

芎勝丹

芎藭丸

鶴膝風

大防風湯

補腎地黃丸

解顱

補腎地黃丸

扶元散

封頤散

頤陷

補中益氣湯

固真湯

烏附膏

頤填

瀉青丸

大連翹飲

防風升麻湯

理中湯

中惡

蘇合香丸

御纂醫宗金鑑卷五十五目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷五十五

編輯幼科雜病心法要訣

發熱門

諸熱總括

小兒有病多發熱表裏虛實宜分別觀形容色辨因由
審證切脈有妙訣表證須汗裏下之虛則宜補實則瀉
平昔體認要精詳方得臨時無遺闕

註 小兒發熱有表裏虛實之異治亦有汗下補瀉之殊須觀形察色審證切脈以別之惟在平昔講習精詳臨證庶不致悞

表熱

表熱之證因外感脈浮發熱惡風寒頭痛身疼而無汗
十神通聖表為先

注 小兒外感寒邪脈浮發熱惡風寒頭疼身痛無汗此表熱也宜十神湯主之若兼內熱者雙解通

聖湯兩解之

十神湯

升麻

葛根

麻黃

香附

醋炒

陳皮

蘇葉

赤芍藥

川芎

香白芷

甘草

生

引用生薑水煎服

方歌十神湯治表熱證升麻乾葛共麻黃香附陳皮蘇

葉芍芎芷甘草引生薑

雙解通聖湯

方見傷寒

裏熱

裏熱之證因內熱徧身蒸熱小便紅面赤唇焦舌燥渴
調胃白虎解毒清

註小兒肥甘過度必生內熱以致發熱蒸蒸小便赤

瀉面赤唇焦舌燥而渴脈實有力者先以調胃承

氣湯下之不愈用白虎湯或黃連解毒湯清之

調胃承氣湯

大黃

芒消

甘草

引用生薑水煎服

方歌

調胃承氣治裏熱大黃甘草共芒消引用生薑水

煎服大便通利熱自消

白虎湯

石膏

煨

知母

生

甘草

生

粳米

水煎服

方歌

胃熱白虎湯知母生用良石膏合甘草粳米共煎

嗜

黃連解毒湯

黃芩

黃連

梔子

黃蘗

水煎服

方歌黃連解毒湯清熱效非常
芩連梔子蘘煎服保安

康

虛熱

虛熱病後營衛弱神倦氣乏用補中嘔渴竹葉石膏治
面赤尿白屨白通

註

虛熱者因小兒病後氣血虛弱榮衛尚未調勻之
故其證神倦氣乏宜用補中益氣湯治之若兼口

渴引飲而嘔者宜用竹葉石膏湯治之又有陰盛
格陽外浮發熱者其面色雖赤然小便必清白四
肢必厥逆宜用白通湯收斂陽氣熱退自愈

補中益氣湯

方見瘡泄

竹葉石膏湯

竹葉

石膏

煨

人參

麥冬

去心

甘草

生

半夏

薑製

粳米

引用生薑水煎服

方歌

病後虛熱煩渴嘔皆因氣弱胃津亡竹葉石膏參

麥草半夏粳米共生薑

白通湯

乾薑

附子

製

葱

水煎服

方歌

虛熱原於陰格陽真寒假熱白通湯散寒薑附蔥

白芷厥回熱退自然康

實熱

實熱積熱午潮熱腹脹尿紅大便難煩渴口瘡腮頰赤
涼膈大柴效通仙

註

小兒有餘積熱以致午後潮熱蒸蒸有汗肚腹脹
滿小便赤大便難煩渴啼叫口舌生瘡腮頰紅赤
脈洪數有力法宜清熱通利時時熱者涼膈散主

之午後潮熱者大柴胡湯主之

涼膈散

方見急驚風

大柴胡湯

方見傷寒

積滯門

積滯總括

小兒養生食與乳搏節夫宜積滯成停乳傷食宜分晰
因證調治保安寧

註

夫乳與食小兒資以養生者也胃主納受脾主運
化乳貴有時食貴有節可免積滯之患若父母過
愛乳食無度則宿滯不消而病成矣醫者當別其
停乳傷食之異臨證斟酌而施治焉

乳滯

嬰兒乳滯睡不安多啼口熱吐驚煩肚脹腹熱便酸臭
慎攻宜用消乳丸

註乳滯之兒其候睡卧不寧不時啼呌口中氣熱頻
吐乳片肚脹腹熱大便酸臭也但臟腑嬌嫩不可
過攻惟宜調和脾胃為上以消乳丸消導之

消乳丸 方見傷乳吐

食滯

小兒食滯任意餐頭溫腹熱便膿酸噯氣惡食煩作渴
大安承氣審宜先

註

小兒恣意肥甘生冷不能運化則腸胃積滯矣其
證頭溫腹熱大便酸臭噯氣惡食煩不安眠口乾
作渴滯輕者宜木香大安丸消導之滯重便秘者
宜小承氣湯攻下之

木香大安丸

木香

黃連

陳皮

白朮

土炒

枳實

麩炒

山查肉

各三錢

連翹

二錢
去心

神麩

炒

麥芽

各三錢
炒

砂仁

萊菔子

各二錢
焙

右為細末神麩糊為丸每服一錢陳倉米湯下

小承氣湯

方見食痛

癖疾門

癖疾總括

癖疾過食腸胃滿濁液外溢被寒凝潮熱飲冷肌削瘦
腹滿硬塊面黃青

註

癖疾一證皆因飲食過節腸胃填滿濁汁外溢復
感寒氣凝結而成每生於左脇之下始如鷄卵堅
硬成塊漸如覆盆之形越臍則難治矣其候身體
潮熱喜飲涼水肌膚削瘦面色青黃也治者宜詳

察之

癰疾證治

癰疾潮熱渴飲冷肚大青筋堅硬疼內服消癰木香效
外貼紅花膏最靈

註癰疾之始作也午後潮熱口渴飲冷肚大青筋漸

至堅硬成塊不時作痛內以千金消癰丸治之外
貼紅花膏內外兼治其癰自消若無熱渴者先以
木香丸治之外亦以紅花膏貼之

千金消癖丸

蘆薈

阿魏

另為糊

青黛

木香

厚朴

薑炒

檳榔

陳皮

甘草

生 各一錢

史君子

去殼

胡黃連

山查肉

香附

醋炒

三棱

醋炒

莪朮

各二錢
醋炒

水紅花子

神麴

炒

麥芽

各四錢
炒

人參

白朮

土炒

茯苓

各三錢

右為細末將阿魏一錢白水和麴打糊為丸菜豆
大米飲下量兒大小服之

木香丸

木香

蓬莪朮

縮砂仁

青皮

硃砂

各二錢
研細

右為細末和勻飛白麩糊和丸麻子大每服二三
九乳傷乳飲下食傷以所傷物熬湯下

紅花膏

沒藥

五錢

血竭

麝香

阿魏

各三錢

當歸

赤芍

各一錢

水紅花料

一捆煎汁去
渣嫩膏一碗

右為細末入膏內攪勻以青布攤貼患處

汗證門

汗證總括

自汗屬陽有虛實或因胃熱或表虛睡中盜汗為陰弱
心虛血熱隨證醫

註

汗乃人之津液存於陽者為津存於陰者為液發
洩於外者為汗若汗無故而出者乃因陰陽偏勝
也如小兒無因而汗自出者謂之自汗自汗屬陽
有虛實之別虛者汗出翕翕發熱惡寒乃表虛也

汗出蒸蒸發熱不惡寒乃裏熱也表虛者法當固
表裏實者法當攻熱又有睡則汗出覺則汗止謂
之盜汗盜汗主陰虛然當分心虛不固心火傷陰
也心虛當補心心熱當涼血治者宜詳辨之庶無
差謬

自汗

表虛自汗玉屏風甚者桂枝加附從裏實自汗用白虎
便秘調胃承氣攻

註
表虛澀澀自汗玉屏風散主之若惡寒冷陽氣虛
也桂枝湯加附子固之陽明裏實蒸蒸自汗用白
虎湯清之便秘者以調胃承氣湯攻之

玉屏風散

黃耆

蜜炙

防風

白朮

土炒

水煎服

方歌
表氣虛弱時自汗玉屏風治頗相宜黃耆防風炒

白朮水煎溫服不拘時

桂枝加附子湯

白芍藥

桂枝

甘草

炙

附子

製

引用薑棗水煎服

方歌表氣虛弱甚桂枝湯最良芍藥桂枝草加附病漸

康

白虎湯

方見裏熱

調胃承氣湯

方見裏熱

盜汗

心虛盜汗睡多驚酸棗仁湯服即寧心火傷陰必煩熱
當歸六黃湯奏功

註

盜汗有二虛實兩分心虛者陰氣不斂也睡則多
驚以酸棗仁湯主之心熱者火傷於陰也身多煩
熱以當歸六黃湯主之

酸棗仁湯

當歸

白芍

炒

生地

茯苓

酸棗仁

炒

知母

炒

黃蘗

炒

五味子

人參

黃耆

炙

水煎服

方歌

酸棗仁湯治盜汗陽不能藏陰本虛歸芍生地茯

苓棗知蘗五味共參耆

當歸六黃湯

當歸

生地黃

熟地黃

黃芩

黃蘗

黃連

黃耆

炙

引用浮麥水煎服

方歌 當歸六黃治盜汗陽盛傷陰液自流生熟二地芩

連蘗歸耆浮麥汗能收

失血門

失血總括

陰乘陽熱血妄行血犯氣分不歸經血病及腑滲濁道
傷於藏者溢出清熱犯陽絡上吐衄熱侵陰絡下失紅
又有努勞成血病血止仍嗽勢多凶

註

凡失血之證陽盛乘陰則血為熱迫不能安於絡
中犯於氣分妄行不能歸入經絡也若血病傷及
於腑者則血滲入腸胃之濁道上行於咽出而為

吐為衄下從二便而出為便為溺也若血病傷及於藏者則溢出於胸中之清道上從喉出而兼咳嗽下從精竅而出為溺血也夫血藏於臟內行於脈中流於軀殼之內不可得而見也非損傷不能為病而損之之因有三一曰熱傷陽絡腑病也熱傷陰絡藏病也宜以清熱為主一曰勞傷宜以破逐為主一曰勞傷宜以理損為主若日久血止而咳嗽不休者主必死之證故勢多凶也

衄血

衄血之候鼻乾燥身熱不渴苦頭疼失表分汗麻桂治
內熱犀角瀉心清

註衄血者鼻中出血也其候鼻中乾燥身熱不渴苦

頭痛是熱傷陽絡也有因傷寒失汗衄血者乃熱
鬱於營其身無汗宜以麻黃湯汗之身有汗者宜
以桂枝湯解之設無表病因內熱而衄者宜以犀
角地黃湯清之熱盛者四物三黃瀉心湯瀉之外

俱用髮灰散或黑梔子末吹鼻其衄自止

麻黃湯

麻黃

杏仁

炒去皮尖

桂枝

甘草

生

引用生薑水煎服

方歌傷寒失表營鬱熱身體無汗血妄行須用麻黃湯

調治桂枝麻黃杏草同

桂枝湯

方見自汗

犀角地黄湯

牡丹皮

白芍藥

犀角

生地黃

水煎服

便硬者加川大黃

方歌

犀角地黄湯治衄效非常丹皮芍犀地便秘加大

黃

四物三黃瀉心湯

川芎

當歸

酒洗

生地黃

赤芍藥

黃芩

黃連

川大黃

酒洗

水煎服

方歌

四物三黃瀉心湯熱盛吐衄功最良芎歸生地赤

芍藥黃芩黃連川大黃

髮灰散

取壯實人頭髮陰陽瓦煨成灰放在地上去火性研細末吹入鼻中血衄自止

吐血

吐血不咳因熱逆若兼咳嗽努勞傷內熱犀角地黃治努傷承氣四物嗜勞傷有熱雞蘇散無熱須用救肺良

註小兒吐血不咳嗽者多因內熱致血妄行上逆也

宜以犀角地黃湯主之若因努勞吐血者則兼咳嗽先用桃仁承氣湯以破逐之次用加味四物湯

和之又有勞傷吐血者亦兼咳嗽痰中帶血有熱者雞蘇散主之無熱者救肺散主之

犀角地黄湯

方見本門衄血

桃仁承氣湯

桃仁

去皮尖研

大黃

芒消

甘草

桂枝

加當歸芍藥蘇木紅花

水煎服

方歌

努傷吐血先破逐桃仁承氣湯妙絕桃仁黃消草

桂枝加入歸芍蘇紅捷

加味四物湯

當歸

芍藥

川芎

生地黃

茅根

蒲黃

牡丹皮

梔子

炒黑

甘草

生

引用藕節酒水煎服

方歌 努傷吐血須活血四物為主真妙訣再加茅根與

蒲黃丹皮梔草引藕節

雞蘇散

雞蘇薄荷葉

川貝母

去心

麥門冬

去心

桔梗

阿膠

蛤粉炒

生地黃

甘草

生

黃耆

炙

白茅根

蒲黃

炒

水煎服

方歌

勞傷有熱嗽痰血雞蘇貝母麥門冬桔梗阿膠生

地草黃耆茅根蒲黃同

加味救肺散

麥冬

去心

人參

黃耆

炙

鬱金

五味子

當歸

酒洗

白芍藥

酒炒

川貝母

去心研

甘草

炙

馬兜鈴

水煎服

方歌

勞傷無熱嗽痰血加味救肺麥門冬參耆鬱金五

味子歸芍貝母草兜鈴

便血

熱傷陰絡病便血藏毒血黯腸風紅須辨腹痛肛腫痛

熱盛濕盛要分明藏毒初起腫痛甚大黃皂刺莫消傳
熱盛俱宜槐花散濕盛平胃地榆靈日久衄微氣血弱
升陽和血共養榮

註

大便下血皆因小兒恣食肥甘致生內熱傷陰絡
也若血色黯而濁肛門腫痛先血後糞此為近血
名曰藏毒若血鮮而清腹中不痛先糞後血此為
遠血名曰腸風藏毒肛門每多腫痛初起宜用皂
刺大黃湯消之天下血後熱盛微痛者以槐花散

和之濕盛不痛者以平胃地榆湯和之腸風亦宜
以槐花散主之便血日久脈微氣血弱者升陽和
血湯和之繼以人參養榮湯補之

皂刺大黃湯

皂刺

生川大黃

各等分

量小兒年歲大小虛實酌其多少水酒煎服

槐花散

槐花
炒

側柏葉

枳殼

麩炒

川黃連

荊芥穗

炒

水煎服

臟毒加蒼朮苦楝

腸風加秦艽防風

方歌

臟毒腸風槐花散黃連枳殼槐栢荊臟毒蒼朮苦

楝入腸風須加艽防風

平胃地榆湯

蒼朮

炒

陳皮

厚朴

薑炒

甘草

地榆

引用生薑水煎服

方歌

便血濕盛腹不痛須用平胃地榆湯蒼朮陳皮厚
朴草地榆同煎引生薑

升陽和血湯

黃耆

炙

當歸

酒洗

白芍
炒

牡丹皮

陳皮

肉桂

秦艽

生地黄

熟地黄

生甘草

炙甘草

蒼朮
炒

升麻

水煎服

方歌
下血日久腹中痛治宜升陽和血湯二地二草者

歸芍陳丹秦朮升桂蒼

人參養榮湯

人參

黃耆

炙

白朮

土炒

白茯苓

白芍藥

炒

肉桂

熟地黃

當歸

酒洗

甘草

炙

陳皮

引用薑棗水煎服

方歌

失血日久氣血虛人參養榮湯頗宜參耆朮苓白

芍桂地黃當歸草陳皮

溺血

溺血多緣精竅病尿血分出莖或疼牛膝四物湯調治
急宜煎服效從容

註

溺血為精竅之病乃尿與血先後分出者也宜用

牛膝四物湯治之其證自愈

牛膝四物湯

牛膝

木通

鬱金

甘草梢

瞿麥

當歸

川芎

生地黃

赤芍藥

水煎服

方歌 小兒溺血精竅病宜用牛膝四物湯牛膝鬱金通

瞿草歸芎赤芍生地黃

雜證門

二便秘結

小兒熱結二便秘口渴舌乾脣面紅八正尿秘少腹滿
神芎便秘腹脹疼

註

此證多因乳食停滯生熱結於腸胃以致二便秘
結其候舌乾口渴面赤脣焦也熱積則小便秘瀉
少腹滿急宜八正散主之若食積大便秘腹脹痛
者宜神芎丸主之

八正散

方見不小便

神芎丸

大黃

滑石

各一兩
水飛

薄荷

川芎

各四錢

黃芩

黃連

各五錢
生

牽牛

四錢

共為細末滴水為丸每服五丸蜜湯化下

氣虛脫肛

瀉痢日久中氣陷肛鬆腸薄滑而脫面色青黃指梢冷
脈來沉細脣淡白補中益氣湯升舉真人養藏固滑脫
外用瀉腸散調敷氣升肛瀉腸自合

註

脫肛一證因瀉痢日久中氣下陷腸胃薄瘦遂令
肛門滑脫不收現證面色青黃指梢冷脈沉細脣
色淡白宜溫補為主先以補中益氣湯升提其氣
再以真人養藏湯溫補固滑外以瀉腸散摻之則
氣升肛瀉而腸自收矣

補中益氣湯

方見瘡瀉

真人養藏湯

方見寒痢

澁腸散

訶子

赤石脂

龍骨

各等分
煨

右為細末用臘茶調敷和藥摻腸頭上綿帛揉入

肛腫翻肛

積熱肛腫大便難努力肛出翻不還外用蟠龍散消腫

內宜皂刺大黃煎

註 小兒積熱太盛以致肛門作腫大便艱難努力翻
出肛脫不還外用蟠龍散消其腫內服皂刺大黃
湯其腫一消肛自收矣

皂刺大黃湯 方見便血

曾氏蟠龍散

乾地蟠龍

一兩畧
去土焙

風化朴消

二錢

右剉研為細末仍和勻朴消每以二錢至三錢肛

門濕潤者乾塗乾燥者用清油調塗先用荊芥生
葱煎水候溫洗浴輕與拭乾然後敷藥

龜胸

肺積痰熱病龜胸胸骨高聳若龜形氣急喘咳體羸瘦
寬氣百合酌量行

註

龜胸一證多因小兒飲食不節痰熱熾盛復為風
邪所傷風熱相搏以致肺經脹滿攻於胸膈高如
覆杯現證咳嗽喘急身體羸瘦治宜清肺化痰為

主先以寬氣飲開其氣道再以百合丹除其壅滯
肺熱清而脹滿自除矣

寬氣飲

杏仁

去皮尖炒

桑白皮

炒

橘紅

蘇子

炒

枳殼

麩炒

枇杷葉

蜜炙

麥門冬

去心

生甘草

苦苧蒹

水煎服

方歌

寬氣飲治兒龜胸杏仁桑皮合橘紅蘇子枳殼枳

杷葉甘草葶藶麥門冬

百合丹

百合

天門冬

杏仁

炒去皮尖

木通

桑白皮

炒

甜葶藶

石膏

各五錢

大黃

三錢

共為細末煉蜜丸如菉豆大量兒大小服之臨卧
滾白水送下

龜背

龜背坐早被風吹偃僂背高狀如龜內服松蕊丹緩治
外用灸法點龜尿

註

龜背者因嬰兒坐早被客風吹入脊膂遂致偃僂
曲折背高如龜徃徃為終身痼疾內以松蕊丹調
治之外用聖惠灸穴法灸肺俞心俞膈俞三穴三

五壯或以龜尿點骨節上亦可得效

松齒丹

松花

枳殼

麩炒

防風

獨活

各一兩

麻黃

前胡

川大黃

生

桂心

各五錢

右為細末煉蜜丸如黍米大每服十九粥飲送下

五軟

五軟稟賦不足證頭項手足口肉肌地黄丸與扶元散
全在後天調養宜

註

五軟者謂頭項軟手軟足軟口軟肌肉軟是也頭
軟者項軟無力也手足軟者四肢無力也肉軟者
皮寬不長肌肉也口軟者脣薄無力也此五者皆
因稟受不足氣血不充故骨脈不强筋肉痿弱治
宜補氣為主先以補腎地黄丸補其先天精氣再
以扶元散補其後天羸弱漸次調理而五軟自強

矣

補腎地黄丸

熟地黄

一兩五錢

山萸肉

一兩

懷山藥

炒

茯苓

各八錢

牡丹皮

澤瀉

各五錢

牛膝

八錢

鹿茸

五錢
酥炙

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二錢用鹽湯

下

扶元散

人參

白朮

土炒

茯苓

熟地黄

茯神

黃耆

蜜炙

山藥

炒

炙甘草

當歸

白芍藥

川芎

石菖蒲

引用薑棗水煎服

方歌

五軟扶元散堪嚙參朮茯苓熟地黃茯神黃耆山
藥草歸芍川芎及石菖

五鞭

陽氣不營成五鞭仰頭取氣難搖動手足強直冷如冰
氣壅胸膈牽連痛小續命湯最為良烏藥順氣散極應
若遇肝木乘脾經加味六君妙無竟

註

五鞭者仰頭取氣難以動搖氣壅疼痛連胸膈間
手心足心冰涼而鞭皆由陽氣不營於四末最為

難治重者以小續命湯踈其風輕者以烏藥順氣散調其氣若肝木乘脾食少氣弱者加味六君子湯治之內外交治而證自日瘥矣

小續命湯

人參

麻黃

川芎

黃芩

芍藥

甘草
炙

防風

官桂
去皮

附子

泡去皮臍

杏仁

炒去皮尖

漢防已

引用薑棗水煎服

方歌

小續命湯治五鞭人參麻黃川芎共黃芩芍藥草
防風官桂附子防已杏

烏藥順氣散

麻黃

白芷

川芎

桔梗

枳殼

炒

殭蠶

炒

烏藥

炮薑

甘草

生

橘紅

引用葱白水煎服

方歌

烏藥順氣五鞭輕麻黃白芷合川芎桔梗枳殼殭

蠶炒烏藥炮薑草橘紅

加味六君子湯

人參

白朮

炮薑

陳皮

半夏

製

茯苓

炙甘草

升麻

蜜炙

柴胡

醋炒

肉桂

水煎服

方歌

加味六君虛五鞭人參白朮共炮薑陳半茯苓炙

甘草升麻柴胡肉桂良

五遲

小兒稟來氣血虛筋骨軟弱步難移牙齒不生髮疎薄
身坐不穩語言遲加味地黃為主治補中益氣繼相醫
邪乘心氣菖蒲好血虛髮遲莖勝宜

註

小兒五遲之證多因父母氣血虛弱先天有虧致
兒生下筋骨軟弱行步艱難齒不速長坐不能穩
要皆腎氣不足之故先用加味地黃丸滋養其血
再以補中益氣湯調養其氣又足少陰為腎之經
其華在髮若少陰之血氣不足即不能上榮於髮

菖勝丹主之又有驚邪乘入心氣至四五歲尚不能言者菖蒲丸主之

加味六味地黄丸

熟地黄

一兩

山萸肉

一兩

懷山藥

炒

茯苓

各八錢

澤瀉

牡丹皮

各五錢

鹿茸

三錢
炙

五加皮

五錢

麝香

五分

共為細末煉蜜丸如梧桐子大大兒每服二錢小

兒一錢五分鹽湯送下

補中益氣湯

方見瘡瀉

芎勝丹

當歸

洗焙

生地黃

白芍藥

各一兩
炒

芎勝子

二兩
碾

胡粉

三錢
碾

右同研勻煉蜜為丸如黍米大每服十粒煎黑豆

湯下

菖蒲丸

人參

石菖蒲

麥門冬

去心

遠志

去心

川芎

當歸

酒洗

乳香

硃砂

各一錢
水飛

右為細末煉白蜜為丸如黍米大食遠用米湯送

下

鶴膝風

小兒稟賦不充盈肌肉削瘦少崢嶸膝骨外露如鶴膝
多緣腎弱髓難生血脈不榮筋攣縮膝貯風涎時作疼
大防風湯宜先服地黄繼進莫從容

註

小兒鶴膝風多因稟賦不足血氣不榮肌肉削瘦
遂致骨節外露筋脈攣縮股漸細小而膝蓋愈大
要皆腎虛不能生精髓之故也須先服大防風湯
繼以補腎地黄丸治之庶氣血充而證自愈矣

大防風湯

人參

白朮

土炒

茯苓

甘草

炙

熟地黄

當歸身

白芍藥

炒

川芎

黃耆

蜜炙

羌活

防風

附子

製

杜仲

牛膝

引用薑棗水煎服

方歌

大防風湯八珍耆羌防附子杜仲移榮筋更有川

牛膝虛風鶴膝最相宜

補腎地黃丸

方見五軟

解顱

小兒解顱最堪憐先天有損腦髓乾面色眊白形瘦弱
二目多白若愁煩補腎地黃丸堪服補陽扶元散為先
更有封頤散極效臨時攤貼保安然

註
解顛者乃顛大骨縫不合也蓋腎生髓腦為髓海
腎氣有虧腦髓不足亦如花木無根現證面色晄
白形體瘦弱目多白睛悲愁少笑治宜補養腎氣
為主先以補腎地黄丸滋補其陰再以扶元散補
養其氣外用封顛散攤貼之則精血稍充或可轉
危為安也

補腎地黄丸

扶元散

俱見五載

封頭散

栢子仁

防風

天南星

各四兩

右為細末每用一錢以豬膽汁調勻攤在緋絹帛
上看頭大小剪貼一日一換不得令乾時時以湯
潤動

頭陷

小兒緣何頭下陷瀉久脾虧虛弱見面目青黃四肢涼

六脈沉緩神慘淡補中益氣湯最宜固真湯進有奇驗
外用烏附膏攤貼溫中理脾功無限

註

小兒藏府有熱渴飲水漿致成瀉痢久則脾氣虛
寒不能上充腦髓故顛陷成坑名曰顛陷現證面
目青黃四肢逆冷六脈沉緩神氣慘淡先以補中
益氣湯升提其氣再以固真湯溫補其脾外用烏
附膏攤貼於陷處極效

補中益氣湯

方見瘡瀉

固真湯

方見慢脾風

烏附膏

雄黃

二錢

川烏

附子

各五錢
生

右為細末用生葱和根葉細切杵爛入前藥末同煎作成膏每早空心貼陷處

頭填

頭門腫起氣上衝其間虛實要分明毛髮憔悴頻頻汗

胸高氣促口唇紅肝盛瀉青丸最效裏熱連翹飲堪行
因表防風升麻劑鞭冷屬陰用理中

註

頭填者謂頭門腫起也蓋因乳哺無度或寒或熱
乘於脾經致使藏府不調其氣上衝為之填脹腫
突現證毛髮憔悴頻頻出汗胸高氣促口唇色紅
須分虛實治之肝氣盛者瀉青丸主之裏熱盛者
大連翹飲主之因表者防風升麻湯主之堅鞭不
熱者屬陰理中湯主之

瀉青丸

方見急驚風

大連翹飲

柴胡

荆芥

連翹

去心

木通

滑石

水飛

梔子

蟬退

去足翅

瞿麥

當歸

酒洗

赤芍藥

黃芩

甘草

生

防風

水煎服

方歌連翹飲治熱上衝柴胡荆芥翹木通滑石桅子蟬

瞿麥歸芍黃芩草防風

防風升麻湯

麥冬
去心

木通

甘草節

山梔

升麻

防風

引用淡竹葉水煎服

方歌

防風升麻湯頗填效非常
參冬木通草山施升麻

防

理中湯

方見不乳

中惡

小兒神氣未充實觸惡何能自主
持目閉面青驚悶亂
蘇合皂角功效奇


註

小兒神氣未充一為邪惡所觸何能主持自然神

魂離舍目閉面青悶亂不省人事內以蘇合香丸
除其邪外以皂角末開通其閉嚏出則氣通而甦
矣

蘇合香丸

方見肛門內合



御纂醫宗金鑑卷五十五